



VERANÓPOLIS

Mantenha em dia sua vacinação contra a Febre Amarela

Categoria: Saúde

Data de Publicação: 28 de abril de 2021

Devido às notificações de casos de Epizootia (bugios mortos e confirmados laboratorialmente para Febre Amarela) em diversos pontos do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde de Veranópolis reforça a importância de manter em dia a vacinação contra a Febre Amarela. Os bugios (e os macacos-prego, no caso do RS), são considerados sentinelas da febre amarela e não causam riscos à população. Esses primatas servem como indicadores da presença do vírus no ambiente silvestre. Eles adoecem depois que são picados pelo mosquito transmissor, o *Haemagogus*. Humanos não vacinados são contaminados somente ao serem picados por esses mosquitos infectados. As pessoas não vacinadas que habitam regiões rurais ou silvestres, ou que se deslocam para essas áreas, estão sob risco de contrair a doença. A melhor forma de prevenção à Febre Amarela é a vacinação. A vacina utilizada no Brasil é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz e está disponível para a população nas Unidades Básicas de Saúde do município. Também é importante lembrar que deve-se sempre usar repelentes em ambientes silvestres. Crianças devem tomar a primeira dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Para as crianças que não realizaram a vacina no período, a recomendação é procurar orientações no seu Posto de Saúde de sua referência. A partir dos 5 anos, crianças que não foram vacinadas podem tomar apenas uma dose. Esta dose única deve ser aplicada até os 59 anos de idade. Pessoas que já realizaram pelo menos uma dose, já são consideradas imunizadas, sem necessidade de nova dose. A vacinação de pessoas com mais de 60 anos de idade, gestantes e mulheres que estejam amamentando crianças menores de 6 meses deve ocorrer em situações especiais (como emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco, mediante a avaliação de risco/benefício, feita por um médico). Em mulheres que estejam amamentando, pode-se considerar a suspensão do aleitamento materno por 10 dias. Pessoas com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas segundo orientações do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). O que é a doença? A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido, no meio rural e silvestre, pelo mosquito *Haemagogus*. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito *Aedes aegypti*. Os sintomas incluem: início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas ou no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver algumas complicações, como febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. em Informações: Secretaria Estadual da Saúde./em